
(a) SO_4
INMAP-4 km (μg/m^3)
WRF-CMAQ (μg/m^3)
INMAP-4 km 6.5 μg/m^3,
WRF-CMAQ 6.2 μg/m^3,
MB 0.3 μg/m^3,
R 0.5,
Slope 1.5,
NMB 4.5 %,
NME 44.0 %


(b) NO_3
INMAP-4 km (μg/m^3)
WRF-CMAQ (μg/m^3)
INMAP-4 km 16.7 μg/m^3,
WRF-CMAQ 13.3 μg/m^3,
MB 3.4 μg/m^3,
R 0.6,
Slope 1.4,
NMB 25.6 %,
NME 38.2 %


(c) NH_4
INMAP-4 km (μg/m^3)
WRF-CMAQ (μg/m^3)
INMAP-4 km 6.5 μg/m^3,
WRF-CMAQ 5.4 μg/m^3,
MB 1.1 μg/m^3,
R 0.8,
Slope 1.4,
NMB 21.3 %,
NME 32.7 %


(d) pri_$PM_{2.5}$
INMAP-4 km (μg/m^3)
WRF-CMAQ (μg/m^3)
INMAP-4 km 33.5 μg/m^3,
WRF-CMAQ 32.0 μg/m^3,
MB 1.5 μg/m^3,
R 0.7,
Slope 1.1,
NMB 4.6 %,
NME 28.8 %,